

Vypočtete:

1. $I = \iiint_A x^2 y z \, dx \, dy \, dz$, A : kvádr $\langle 1, 3 \rangle \times \langle 0, 2 \rangle \times \langle 1, 2 \rangle$.

Množina A je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned} 1 &\leq x \leq 3 \\ 0 &\leq y \leq 2 \\ 1 &\leq z \leq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^3 \left(\int_0^2 \left(\int_1^2 x^2 y z \, dz \right) dy \right) dx = \int_1^3 \left(\int_0^2 x^2 y \left[\frac{z^2}{2} \right]_1^2 dy \right) dx \\ &= \int_1^3 \left(\int_0^2 x^2 y \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right) dy \right) dx = \frac{3}{2} \int_1^3 \left(\int_0^2 x^2 y \, dy \right) dx = \frac{3}{2} \int_1^3 x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx \\ &= \frac{3}{2} \int_1^3 x^2 \left(\frac{4}{2} - 0 \right) dx = \frac{3}{2} \cdot 2 \int_1^3 x^2 \, dx = 3 \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = 3 \cdot \frac{1}{3} (3^3 - 1^3) = 27 - 1 = 26. \end{aligned}$$

2. $I = \iiint_A x \, dx \, dy \, dz$, A : $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 2$.

Množina A je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned} 0 &\leq x \leq 2 \\ 0 &\leq y \leq 2 - x \\ 0 &\leq z \leq 2 - x - y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} \left(\int_0^{2-x-y} x \, dz \right) dy \right) dx = \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} x [z]_0^{2-x-y} dy \right) dx \\ &= \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} x (2 - x - y) \, dy \right) dx = \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (2x - x^2 - xy) \, dy \right) dx \\ &= \int_0^2 \left[2xy - x^2 y - x \frac{y^2}{2} \right]_0^{2-x} dx = \int_0^2 \left[2x(2-x) - x^2(2-x) - x \frac{(2-x)^2}{2} \right] dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{x^3}{2} - 2x^2 + 2x \right) dx = \left[\frac{x^4}{8} - 2 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{2^4}{8} - 2 \cdot \frac{2^3}{3} + 2 \cdot \frac{2^2}{2} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

3. $I = \iiint_A xyz \, dx \, dy \, dz$, A : I. oktant, $z = 0, z = xy, y = x, y = 1$.

Množina A je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned} 0 &\leq x \leq 1 \\ x &\leq y \leq 1 \\ 0 &\leq z \leq xy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\int_x^1 \left(\int_0^{xy} xyz \, dz \right) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_x^1 xy \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{xy} dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_x^1 xy \frac{x^2 y^2}{2} dy \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_x^1 x^3 y^3 \, dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^3 \left[\frac{y^4}{4} \right]_x^1 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 x^3 (1^4 - x^4) \, dx = \frac{1}{8} \int_0^1 (x^3 - x^7) \, dx \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^8}{8} \right]_0^1 = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{64}. \end{aligned}$$

4. $I = \iiint_A \frac{1}{x} \, dx \, dy \, dz$, A : $x + y + z = 4, x = 1, x = 2, y = 0, y = x, z = 0$.

Množina A je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned} 1 &\leq x \leq 2 \\ 0 &\leq y \leq x \\ 0 &\leq z \leq 4 - x - y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_1^2 \left(\int_0^x \left(\int_0^{4-x-y} \frac{1}{x} dz \right) dy \right) dx = \int_1^2 \left(\int_0^x \frac{1}{x} [z]_0^{4-x-y} dy \right) dx = \int_1^2 \left(\int_0^x \frac{1}{x} (4-x-y) dy \right) dx \\
&= \int_1^2 \left(\int_0^x \left(\frac{4}{x} - 1 - \frac{y}{x} \right) dy \right) dx = \int_1^2 \left[\frac{4}{x} \cdot y - y - \frac{1}{x} \cdot \frac{y^2}{2} \right]_0^x dx = \int_1^2 \left[\frac{4}{x} \cdot x - x - \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^x dx \\
&= \int_1^2 \left(4 - x - \frac{x}{2} \right) dx = \int_1^2 \left(4 - \frac{3}{2}x \right) dx = \left[4x - \frac{3}{4}x^2 \right]_1^2 = 4 \cdot 2 - \frac{3}{4} \cdot 2^2 - \left(4 \cdot 1 - \frac{3}{4} \cdot 1^2 \right) = \frac{7}{4}.
\end{aligned}$$

5. $I = \iiint_A e^y dx dy dz$, $A : y = 1, y = -x, y = x, z = 0, z = y$.

$$\begin{aligned}
& 0 \leq y \leq 1 \\
\text{Množina } A \text{ je dána nerovnostmi } & -y \leq x \leq y \\
& 0 \leq z \leq y
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 \left(\int_{-y}^y \left(\int_0^y e^y dz \right) dx \right) dy = \int_0^1 \left(\int_{-y}^y e^y [z]_0^y dx \right) dy = \int_0^1 \left(\int_{-y}^y y \cdot e^y dx \right) dy = \int_0^1 y \cdot e^y \cdot [x]_{-y}^y dy \\
&= \int_0^1 y \cdot e^y \cdot [y + y] dy = \int_0^1 2y^2 e^y dy = \left| \begin{array}{l} u = 2y^2 \quad u' = 4y \\ v' = e^y \quad v = e^y \end{array} \right| = [2y^2 e^y]_0^1 - \int_0^1 4ye^y dy \\
&= \left| \begin{array}{l} u = 4y \quad u' = 4 \\ v' = e^y \quad v = e^y \end{array} \right| = 2 \cdot 1^2 \cdot e^1 - 2 \cdot 0 \cdot e^0 - \left([4ye^y]_0^1 - \int_0^1 4e^y dy \right) = 2e - (4 \cdot 1 \cdot e^1 - 0) + 4 \cdot \int_0^1 e^y dy \\
&= -2e + 4 \cdot [e^1 - e^0] = 2e - 4.
\end{aligned}$$

Integrujte transformací do válcových (cylindrických) souřadnic

$$\begin{aligned}
x &= r \cos \varphi \\
y &= r \sin \varphi \\
z &= z \\
|J| &= r.
\end{aligned}$$

1. $I = \iiint_A (x^2 + y^2) dx dy dz$, $A : x^2 + y^2 = 4, z = 0, z = 3$.

$$\begin{aligned}
& 0 \leq r \leq 2 \\
\text{Množina } F^{-1}(A) \text{ je dána nerovnostmi } & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\
& 0 \leq z \leq 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^3 (r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi) \cdot r dz \right) dr \right) d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^3 r^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \cdot r dz \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^3 r^3 dz \right) dr \right) d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^3 [z]_0^3 dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^3 \cdot 3 dr \right) d\varphi = 3 \cdot \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^3 dr \right) d\varphi = 3 \cdot \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 d\varphi \\
&= 3 \cdot \int_0^{2\pi} \frac{2^4}{4} d\varphi = 12 \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi = 12 \cdot [\varphi]_0^{2\pi} = 12 \cdot 2\pi = 24\pi.
\end{aligned}$$

2. $I = \iiint_A xz \, dx \, dy \, dz$, $A : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, I. oktant

$$\begin{aligned} \text{Množina } F^{-1}(A) \text{ je dána nerovnostmi} \quad & 0 \leq r \leq 2 \\ & 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ & 0 \leq z \leq \sqrt{4-r^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 \left(\int_0^{\sqrt{4-r^2}} r \cos \varphi \cdot z \cdot r \, dz \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 \left(\int_0^{\sqrt{4-r^2}} r^2 \cos \varphi \cdot z \, dz \right) dr \right) d\varphi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 r^2 \cos \varphi \cdot \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{4-r^2}} dr \right) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 r^2 \cos \varphi \cdot (4-r^2) dr \right) d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 (4r^2 - r^4) \cos \varphi \, dr \right) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[4 \cdot \frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right]_0^2 \cos \varphi \, d\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \, d\varphi \\ &= \frac{32}{15} \cdot [\sin \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{15} \cdot (1-0) = \frac{32}{15}. \end{aligned}$$

3. $I = \iiint_A \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz$, $A : z = 0, y + z = 4, x^2 + y^2 = 16$.

$$\begin{aligned} \text{Rovina } y + z = 4 &\Rightarrow z = 4 - y = 4 - r \sin \varphi. \\ x^2 + y^2 = r^2 = 16 &\Rightarrow r = 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Množina } F^{-1}(A) \text{ je dána nerovnostmi} \quad & 0 \leq r \leq 4 \\ & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ & 0 \leq z \leq 4 - r \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^4 \left(\int_0^{4-r \sin \varphi} \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} \cdot r \, dz \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^4 \left(\int_0^{4-r \sin \varphi} r^2 \, dz \right) dr \right) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^4 r^2 [z]_0^{4-r \sin \varphi} dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^4 (4r^2 - r^3 \sin \varphi) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{4}{3} r^3 - \frac{r^4}{4} \sin \varphi \right]_0^4 d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{256}{3} - 64 \sin \varphi \right) d\varphi = \left[\frac{256}{3} \varphi - 64 (-\cos \varphi) \right]_0^{2\pi} = \left[\frac{256}{3} \varphi + 64 \cos \varphi \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{256}{3} \cdot 2\pi + 64 \cdot 1 - 0 - 64 \cdot 1 = \frac{512}{3} \pi. \end{aligned}$$

4. $I = \iiint_A yz \, dx \, dy \, dz$, $A : x = 0, y = 0, z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 = x$.

Kulová plocha $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ve válcových souřadnicích - horní mez pro z (dolní mez je $z = 0$):

$$r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi + z^2 = r^2 + z^2 = 1 \implies z^2 = 1 - r^2 \implies z = \sqrt{1 - r^2}$$

Válcová plocha $x^2 + y^2 = x$. Upravíme na čtverec: $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.

(průmětem válcové plochy do roviny xy je kružnice $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ se středem v bodě $(\frac{1}{2}, 0)$ a poloměrem $R = \frac{1}{2}$).

Válcová plocha $x^2 + y^2 = x$ ve válcových souřadnicích:

$$r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi = r \cos \varphi \implies r = \cos \varphi.$$

$$\begin{aligned} \text{Množina } F^{-1}(A) \text{ je dána nerovnostmi} \quad & 0 \leq r \leq \cos \varphi \\ & 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ & 0 \leq z \leq \sqrt{1 - r^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\cos \varphi} \left(\int_0^{\sqrt{1-r^2}} r \sin \varphi \cdot z \cdot r dz \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\cos \varphi} r^2 \sin \varphi \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-r^2}} dr \right) d\varphi \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\cos \varphi} r^2 \sin \varphi \cdot (1-r^2) dr \right) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\cos \varphi} (r^2 - r^4) \sin \varphi dr \right) d\varphi \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right]_0^{\cos \varphi} \sin \varphi d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos^3 \varphi}{3} - \frac{\cos^5 \varphi}{5} \right) \sin \varphi d\varphi \\
&= \left| \begin{array}{l} \cos \varphi = t \quad \varphi = 0 \Rightarrow t = \cos 0 = 1 \\ -\sin \varphi d\varphi = dt \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \end{array} \right| \\
&= \frac{1}{2} \int_1^0 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right) (-dt) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} \cdot \frac{t^4}{4} - \frac{1}{5} \cdot \frac{t^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{30} \right) = \frac{1}{40}.
\end{aligned}$$

5. $I = \iiint_A dx dy dz$, $A : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq z$

Průsečná křivka kulové plochy $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ a parabolické plochy $x^2 + y^2 = z$:

$$z + z^2 = 2 \Rightarrow z^2 + z - 2 = 0 \Rightarrow z_1 = 1, z_2 = -2 \quad (\text{nevyhovuje}) \Rightarrow x^2 + y^2 = 1.$$

Dosadíme válcové souřadnice: $r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi = 1 \Rightarrow r = 1$.

Dolní mez pro z : $z = x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi = r^2$

Horní mez pro z : $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 + z^2 = 2 \Rightarrow z^2 = 2 - r^2 \Rightarrow z = \sqrt{2 - r^2}$

Množina $F^{-1}(A)$ je dána nerovnostmi

$$\begin{array}{l} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ r^2 \leq z \leq \sqrt{2 - r^2} \end{array}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left(\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} r dz \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r \cdot [z]_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} dr \right) d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r \cdot (\sqrt{2-r^2} - r^2) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (r\sqrt{2-r^2} - r^3) dr \right) d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r\sqrt{2-r^2} dr \right) d\varphi - \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\varphi = I_1 - I_2 \\
I_1 &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r\sqrt{2-r^2} dr \right) d\varphi = \left| \begin{array}{l} 2 - r^2 = t \quad r = 0 \Rightarrow t = 2 - 0 = 2 \\ -2r dr = dt \quad r = 1 \Rightarrow t = 2 - 1 = 1 \end{array} \right| \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_2^1 \sqrt{t} \left(\frac{-dt}{2} \right) \right) d\varphi = \frac{1}{2} = \int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 \sqrt{t} dt \right) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^2 d\varphi \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} (2^{\frac{3}{2}} - 1) d\varphi = \frac{1}{3} \cdot (2\sqrt{2} - 1) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{1}{3} \cdot (2\sqrt{2} - 1) \cdot 2\pi = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \pi
\end{aligned}$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\varphi = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

$$I = I_1 - I_2 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} (8\sqrt{2} - 7).$$

Integrujte transformací do sférických (kulových) souřadnic

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \sin \psi \\y &= r \sin \varphi \sin \psi \\z &= r \cos \psi \\|J| &= r^2 \sin \psi.\end{aligned}$$

1. $I = \iiint_A (x^2 + y^2) dx dy dz, \quad A : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4.$

Dosadíme sférické souřadnice:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 &= r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \psi + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \psi + r^2 \cos^2 \psi \\&= r^2 \sin^2 \psi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r^2 \cos^2 \psi = r^2 \sin^2 \psi + r^2 \cos^2 \psi = r^2 (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) = r^2 \leq 4\end{aligned}$$

Množina $F^{-1}(A)$ je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned}0 &\leq r \leq 2 \\0 &\leq \varphi \leq 2\pi \\0 &\leq \psi \leq \pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^\pi (r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \psi + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \psi) \cdot r^2 \sin \psi d\psi \right) dr \right) d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^\pi r^2 \sin^2 \psi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \cdot r^2 \sin \psi d\psi \right) dr \right) d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^\pi r^4 \sin^3 \psi d\psi \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^\pi r^4 \sin^2 \psi \sin \psi d\psi \right) dr \right) d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_0^\pi r^4 (1 - \cos^2 \psi) \sin \psi d\psi \right) dr \right) d\varphi \\&= \left| \begin{array}{l} \cos \psi = t \quad \psi = 0 \Rightarrow t = \cos 0 = 1 \\ -\sin \psi d\psi = dt \quad \psi = \pi \Rightarrow t = \cos \pi = -1 \end{array} \right| \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_1^{-1} r^4 (1 - t^2) (-dt) \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left(\int_{-1}^1 r^4 (1 - t^2) dt \right) dr \right) d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^4 \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^4 \left[1 - \frac{1}{3} - \left(-1 - \frac{-1}{3} \right) \right] dr \right) d\varphi \\&= \frac{4}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 r^4 dr \right) d\varphi = \frac{4}{3} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^2 d\varphi = \frac{4}{3} \cdot \frac{32}{5} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{128}{15} \cdot 2\pi = \frac{256}{15} \pi.\end{aligned}$$

2. $I = \iiint_A \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz, \quad A : 9 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 81, 3x^2 + 3y^2 \leq z^2, z \geq 0.$

Kuželová plocha $3x^2 + 3y^2 = z^2$ ve sférických souřadnicích:

$$\begin{aligned}3r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \psi + 3r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \psi &= 3r^2 \sin^2 \psi = (z^2) = r^2 \cos^2 \psi \\ \Rightarrow \tan^2 \psi &= \frac{1}{3} \Rightarrow \tan \psi = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ nevyhovuje, neboť } z \geq 0 \right) \Rightarrow \psi = \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

Množina $F^{-1}(A)$ je dána nerovnostmi

$$\begin{aligned}3 &\leq r \leq 9 \\0 &\leq \varphi \leq 2\pi \\0 &\leq \psi \leq \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_3^9 \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{r^2} \cdot r^2 \sin \psi \, d\psi \right) dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_3^9 [-\cos \psi]_0^{\frac{\pi}{6}} dr \right) d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_3^9 \left[-\cos \frac{\pi}{6} - (-\cos 0) \right] dr \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_3^9 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) dr \right) d\varphi \\
&= \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \int_0^{2\pi} [r]_3^9 d\varphi = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot 6 \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} \cdot 6 \cdot 2\pi = 6(2 - \sqrt{3})\pi.
\end{aligned}$$

3. $I = \iiint_A \sqrt{z} \, dx \, dy \, dz$, $A : x^2 + y^2 + z^2 = 16, y = \frac{\sqrt{3}}{3}x, y = x, z = 0$, I. oktant.

Dolní mez pro $\varphi : y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$

Horní mez pro $\varphi : y = x \Rightarrow \tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$

Množina $F^{-1}(A)$ je dána nerovnostmi

$$\begin{array}{l}
0 \leq r \leq 4 \\
\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\
0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r \cos \psi} \cdot r^2 \sin \psi \, d\psi \right) dr \right) d\varphi = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^{\frac{5}{2}} \sqrt{\cos \psi} \sin \psi \, d\psi \right) dr \right) d\varphi \\
&= \left| \begin{array}{l} \cos \psi = t \quad \psi = 0 \Rightarrow t = \cos 0 = 1 \\ -\sin \psi \, d\psi = dt \quad \psi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \end{array} \right| \\
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 \left(\int_1^0 r^{\frac{5}{2}} \sqrt{t} (-dt) \right) dr \right) d\varphi = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 \left(\int_0^1 r^{\frac{5}{2}} t^{\frac{1}{2}} dt \right) dr \right) d\varphi \\
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 r^{\frac{5}{2}} \left[\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 dr \right) d\varphi = \frac{2}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^4 r^{\frac{5}{2}} dr \right) d\varphi = \frac{2}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{r^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} \right]_0^4 d\varphi = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} 4^{\frac{7}{2}} d\varphi \\
&= \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} \cdot 2^7 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} \cdot 128 \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} \cdot 128 \cdot \frac{1}{12} \pi = \frac{128}{63} \pi.
\end{aligned}$$

4. $I = \iiint_A dx \, dy \, dz$, $A : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z, x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0$.

Úprava na úplný čtverec: $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 4$

(Koule se středem $S = (0, 0, 2)$ a poloměrem $R = 2$).

Průsečíky $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ a $z^2 = x^2 + y^2$:

$$z^2 + z^2 = 4z \Rightarrow z^2 = 2z \Rightarrow z_1 = 0, z_2 = 2$$

Průsečná křivka je kružnice $x^2 + y^2 = (z^2) = 4$.

Dosadíme sférické souřadnice do rovnice kulové plochy $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$:

$$r^2 = 4r \cos \psi \Rightarrow r = 4 \cos \psi.$$

Dosadíme do rovnice kuželové plochy $x^2 + y^2 \leq z^2$:

$$r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \psi + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \psi = r^2 \sin^2 \psi = r^2 \cos^2 \psi$$

$$\Rightarrow \tan^2 \psi = 1 \Rightarrow \tan \psi = 1 \text{ (-1 nevyhovuje)} \Rightarrow \psi = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{array}{l} \text{Množina } F^{-1}(A) \text{ je dána nerovnostmi} \\ 0 \leq r \leq 4 \cos \psi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{4} \end{array}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{4 \cos \psi} r^2 \sin \psi \, dr \right) d\psi \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \psi \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{4 \cos \psi} d\psi \right) d\varphi \\ &= \frac{64}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \psi \cos^3 \psi \, d\psi \right) d\varphi = \left| \begin{array}{l} \cos \psi = t \quad \psi = 0 \Rightarrow t = \cos 0 = 1 \\ -\sin \psi \, d\psi = dt \quad \psi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow t = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right| \\ &= \frac{64}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} t^3 (-dt) \right) d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 t^3 \, dt \right) d\varphi = \frac{64}{3} \int_0^{2\pi} \left[\frac{t^4}{4} \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 d\varphi \\ &= \frac{64}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \left[1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4 \right] d\varphi = \frac{64}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{1}{4} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi = 4 \cdot 2\pi = 8\pi. \end{aligned}$$